

## Let op: zomerdip bij varkens

De zomer komt eraan, voor veel mensen het favoriete seizoen. Bij varkens is dat zeker niet het geval! Een bekend verschijnsel is de zomerdip. Varkenshouders moeten op tijd actie ondernemen om dit te voorkomen, zoals het bekende spreekwoord zegt; voorkomen is beter dan genezen. Hieronder tips op het gebied van water, voer, management, klimaat en hygiëne.

### Water

Zorg dat er voldoende koel water beschikbaar is en de waterleidingen schoon zijn. Controleer de nippelopbrengst:

- Biggen: 0,6 l/min.
- Vleesvarkens: 0,7 l/min
- Dragende zeugen: 1l/min
- Lacterende zeugen: 2l/min

Geef extra water rondom het werpen, drie dagen vóór en drie dagen na. Voeg vitamine C aan het drinkwater toe.

Verder kan het drogestofgehalte van brijvoer worden verlaagd.

### Voer

Op het gebied van voer is het belangrijk om voerresten in voerbakken te voorkomen om bederf door hoge temperaturen tegen te gaan. Pas voertijden- en schema aan: voer 's morgens wat vroeger en 's avonds wat later, voer niet op het warmst van de dag.

Controleer of de wintercorrectie van het voerschema is afgehaald, stel een zomervoerschema in en bied kleinere porties aan, met name brijvoer en vloeibare voeders in verband met bederf.

### Klimaat

Houd de weerberichten in de gaten zodat u, bij voorspelling van zeer warm weer, de temperatuur in de stal langzaam kunt laten oplopen om de varkens te laten wennen.

Reinig kokers, filters, ventilatoren, openingen voor onderafzuiging e.d.

Pas de klimaatinstellingen aan (alarmgrenzen en bandbreedtes) i.v.m. grote temperatuurschommelingen tussen dag en nacht.

### Management

Ook hier zijn een aantal zaken van belang. Begin op tijd met vliegenbestrijding, controleer de ventilatieregeling en het noodstroomaggregaat.

De conditie van de zeugen moet goed zijn. Voorkom te vette zeugen zodat de voeropname niet beperkt wordt. Te magere zeugen ook voorkomen, die hebben niks bij te zetten als hogere temperaturen zorgen voor lage voeropname.

Stel niet noodzakelijke werkzaamheden uit tot vroege ochtend of later in de avond uit.

Zorg na de langste dag voor minstens zestien uur licht en maximaal acht uur donker. Dit voorkomt najaarswerpen.

### Hygiëne

Op het hygiënisch vlak zijn extra maatregelen erg belangrijk tegen gisting en schimmelvorming van voer. Zorg voor schone silo's en een goede ontluchting, behandel de silo's met een silo-shot.

### Gevolgen zeugen

De voeropname in de kraamstal gaat omlaag als de temperatuur stijgt. Minder melkproductie, dalend speengewicht en een verslechterde conditie.

### Vleesvarkens

Bij zeer hoge temperaturen nemen vleesvarkens minder voer op waardoor ze langzamer groeien. Onbeperkt gevoerde varkens kunnen later gaan compenseren waardoor ze meer spek gaan aanzetten. De groei en het vleespercentage komen lager uit.

Kortom; neem op tijd de nodige maatregelen en geniet van een mooie zomer!